

Lifting de coxa

O excesso de pele nas coxas é uma consequência comum da perda significativa de peso e, às vezes, inevitável com a idade e a gravidade. Apesar de atividade física intensa, muitas vezes não há melhora. Assim, a única solução para isso é o procedimento cirúrgico levantamento (lifting) da coxa, por meio de uma cicatriz horizontal, vertical ou ambas, na parte superior da coxa.

Frequentemente, o lifting de coxa é combinado com a lipoaspiração para obter uma forma aprimorada e harmoniosa. Depois da cirurgia, recomenda-se usar calças de compressão por mais de 6 semanas para obter um contorno ideal.

PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA

ESSA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PODE SER
COMBINADA COM OUTRAS CIRURGIAS AO MESMO
TEMPO?
QUAL É O PROCEDIMENTO SE O RESULTADO NÃO FOR
SATISFATÓRIO?
OS VASOS LINFÁTICOS ESTARÃO PROTEGIDOS NESSA
CIRURGIA?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO

Duração da cirurgia: aproximadamente 2 horas
Anestesia: geral ou local
Recuperação pós cirúrgica: aproximadamente
de 2 a 5 dias
Impossibilidade para fazer atividades físicas:
aproximadamente 4 semanas