

Cirurgia linfática

Linfedema é o acúmulo de líquido linfático no tecido, geralmente em uma extremidade. Isso pode ser primário (sem uma causa comprovada), secundário devido a uma cirurgia ou por radiação de um tumor. A terapia básica é sempre a de compressão e drenagem linfática. Em casos específicos, o tratamento cirúrgico pode melhorar o linfedema. Dependendo da gravidade e causa do linfedema, pode ser usado um simples tratamento de lipoaspiração ou técnicas microcirúrgicas. A terapia microcirúrgica inclui a restauração microcirúrgica das vias linfáticas para outros vasos, veias linfáticas, ou uma transferência de linfonodos.

PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA

PRECISAREI USAR ROUPAS DE COMPRESSÃO APÓS A CIRURGIA?

O LNFEDEMA PODE DETERIORAR OU VOLTAR DEPOIS DA CIRURGIA?

QUAL É A PORCENTAGEM DE SUCESSO NESSE TIPO DE CIRURGIA?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO

Duração: De 1h 30 a 3 horas

Anestesia: geral

Recuperação pós-cirurgia: aproximadamente

2 semanas

Impossibilidade para fazer atividades físicas:

aproximadamente 4 semanas

Correspondence Address:

The London Clinic, Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Private Consultancy:

The London Clinic Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Contact details:

+44 754 054 9873
www.farhadi.com
Email: farhadij@me.com