

Síndrome da Polônia

A síndrome da Polônia é uma malformação congênita rara da mama que leva a um desenvolvimento anormal do mamilo, glândula mamária e músculos da mama. Dependendo da gravidade, são utilizados diferentes métodos de reconstrução ao mesmo tempo na intervenção.

As possibilidades variam desde a injeção de gordura para ajuste do contorno, implante de expansores sob medida e transferência de tecido de outras partes do corpo.

PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA

A SÍNDROME DA POLÔNIA É HEREDITÁRIA?

EXISTE UMA IDADE MÍNIMA PARA REALIZAR
ESSE TIPO DE CIRURGIA?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO

Duração da cirurgia: De 1 a 3 horas

Anestesia: geral

Recuperação pós-cirurgia: de 1 a 4 semanas

Impossibilidade para fazer atividades físicas:
de 2 a 6 semanas

Correspondence Address:

The London Clinic, Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Private Consultancy:

The London Clinic Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Contact details:

+44 754 054 9873
www.farhadi.com
Email: farhadij@me.com