

Braquioplastia – lifting de braço

A cirurgia plástica do braço envolve a remoção de excesso de pele e a compressão da pele do mesmo, produzindo uma cicatriz vertical na parte interna do braço. A cicatriz varia da axila até a parte acima do cotovelo. Este procedimento pode ser combinado com a lipoaspiração para remover qualquer depósito de gordura na área.

Em seguida, recomenda-se o uso de uma blusa (vestimenta) de mangas longas de leve compressão, de malha ou cotton por mais de 6 semanas, a fim de obter um contorno ideal.



PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA

COMO PROCEDER SE O RESULTADO NÃO
FOR SATISFATÓRIO?

A CICATRIZ É VISÍVEL?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO

Duração: aproximadamente 1 hora

Anestesia: geral ou local

Recuperação pós-cirurgia: de 2 a 5 dias

Impossibilidade para fazer atividades
físicas: aproximadamente 4 semanas

Correspondence Address:

The London Clinic, Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Private Consultancy:

The London Clinic Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Contact details:

+44 754 054 9873

www.farhadi.com

Email: farhadij@me.com